


Bagolyvár	9113
Gazdasági dűlő 11.	
hrsz.: 013/59	
historizáló	
1905	
Szabadon álló, téglalap alaprajzú épület, É-i sarkán íves toronnyal és ahhoz csatlakozó támfallal. A homlokzatok és a támfal pártázattal lezárt, neogótikus nyíláskeretelésekkel. Szintváltós, ÉNy-i homlokzata egyemeletes, DK-i földszintes, tornya háromszintes. DNy-i homlokzatához újabb, az eredeti épület méretét meghaladó, földszintes iroda-épület kapcsolódik. A belső erősen átalakítva. Pincéje poroszsüveg boltozatos, tizennégy fa- és betonhordóval (kivitelező: Rostock und Hoffelner, Klosterneuburg). Építtette Weber Ede svájci származású tanár, a település névadója, 1905-ben (építész: Székely Ödön). Itt alakította ki újonnan telepített szőlőbirtokának, a Kecskeméti Szőlőtelepítő Társulat Rt.-nek központját.	

HÉSZ 2. számú függeléke Homlokzatszámítási minták



HA: $h_1, h_2, h_3, h_4, l_1, l_2, l_3, l_4$

3) l_3 akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

Ø $H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + h_2}{2}$

Ø $H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + l_2 - 6,00)}{2}$

Ø $H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + h_3)}{2}$

Ø $H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + h_3)}{2} + h_4$

Ø $H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + h_3 + l_3 - 6,00) + h_4}{2}$

<3,00 Ø Ø <6,00 <6,00 Ø < $\frac{l_3}{3}$ $H_B = \frac{h_2 + h_3}{2}$


>3,00 Ø Ø <6,00 <6,00 Ø < $\frac{l_3}{3}$ $H_B = \frac{h_2 + h_3}{2} + h_4$

<3,00 Ø Ø >6,00 <6,00 Ø < $\frac{l_3}{3}$ $H_B = \frac{h_2 + h_3}{2} + l_2 - 6,00$

>3,00 Ø Ø >6,00 >6,00 Ø < $\frac{l_3}{3}$ $H_B = \frac{h_2 + h_3}{2} + h_4 + l_3 - 6,00$

Megjegyzés: $l_4 > 12,00$, akkor az (A) homlokzaton a h_3 és l_3 figyelmen kívül marad. Valamennyi értéket méterben kell megadni kéttizedes pontossággal.

2. SZÁMÚ PÉLDA




Ha $l_1 < \frac{l_2}{3}$ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

<3,00 < $\frac{l_1}{3}$ $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + t$

>3,00 < $\frac{l_1}{3}$

3. SZÁMÚ PÉLDA




Ha $l_1 < \frac{l_2}{3}$ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + h_3$

< $\frac{l_2}{3}$ <6,00 >3,00 <6,00 $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + h_3 + l_2 - 6,00$

> $\frac{l_2}{3}$ <6,00 <3,00 <6,00

4. SZÁMÚ PÉLDA




$H_A = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4}{4}$

HA $2 \cdot l_1 < 12,00$ m $H_B = h_3$

HA $2 \cdot l_1 > 12,00$ m $H_B = h_2$


HA $l_1 > 12,00$ m $H_B = h_1$

5. SZÁMÚ PÉLDA



Ha $l_2 > \frac{l_1}{3}$ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + t$

6. SZÁMÚ PÉLDA



Ha $n \cdot l_2 < \frac{l_1}{3}$ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

Ha $n \cdot l_2 < \frac{l_1}{3}$ és $t > 3,00$ $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + t$

$n \cdot l_2 > \frac{l_1}{3}$ $t > 3,00$

7. SZÁMÚ PÉLDA



Ha $h < 12,00$ m akkor $H = \frac{h}{2}$

ha $h > 12,00$ m akkor $H = h - 6,00$

HÉSZ 3. számú függeléke
Őshonos növények

Természetesen előforduló, illetve természetvédelmi szempontból a védett természeti területen történő erdőtelepítésben, erdőfelújításban elfogadható fafajok, továbbá fontosabb őshonos erdei cserjefajok a Duna-Tisza közén

KST - kocsányos tölgy - Quercus robur	FRNY - fehér nyár - Populus alba
MOT – molyhos tölgy – Quercus pubescens	SZNY - szürke nyár - Populus canescens
GY - gyertyán - Carpinus betulus	RNY - rezgő nyár - Populus tremula
MJ - mezei juhar - Acer campestre	FTNY - fekete nyár - Populus nigra
EJ - egyéb juhar (tatárjuhar) - Acer tataricum	TNY - tiszaháti nyár - Populus nigra v. thevestina (csak fasorokban)
MSZ - mezei szil - Ulmus minor	FFÜ - fehér fűz - Salix alba
VSZ – vénic-szil - Ulmus laevis	TFÜ - törékeny fűz - Salix fragilis
MK - magas kőris - Fraxinus excelsior	KFÜ - kecskefűz - Salix caprea
MAK - magyar kőris - Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	EFÜ - egyéb fűzek
CSNY - madárcseresznye - Cerasus avium	MÉ - mézgás éger - Alnus glutinosa
ZSM - zselnicemeggy - Padus avium	HÉ - hamvas éger - Alnus incana
AL - vadalma - Malus sylvestris	KH - kislevelű hárs - Tilia cordata
KT - vadvadkörte - Pyrus pyraeaster	NYI - közönséges nyír - Betula pendula
KBO – közönséges boróka – Juniperus communis	SZNYI - szőrös nyír - Betula pubescens

Aláhúzott: örökzöld

Berberis vulgaris - sóskaborbolya	Prunus spinosa – kökény
Cerasus fruticosa - csepleszmeggy	Rhamnus catharticus – varjútövis
Clematis vitalba - erdei iszalag	Ribes rubrum – piros ribiszke
Colutea arborescens – pukkanó dudafürt	Rubus caesius - hamvas szeder
Cornus mas – húsos som	Salix caprea – kecskefűz
Cornus sanguinea - veresgyűrű som	Salix cinerea – rekettyefűz
Corylus avellana - mogyoró	Salix rosmarinifolia – serevényfűz
Crataegus laevigata – cseregalagonya	Salix triandra – mandulalevelű fűz
Crataegus monogyna - egybibés galagonya	Salix viminalis – kosárkötő fűz
Crataegus nigra – fekete galagonya	Sambucus nigra - fekete bodza
Euonymus europaeus - csíkos kecskerágó	Staphylea pinnata - hólyagfa
Euonymus verrucosus – bibircses kecskerágó	Viburnum lantana - ostorménfa
Frangula alnus - kutyabenge	Viburnum opulus - kányabangita
Hedera helix - borostyán	Vitis sylvestris – ligeti szőlő
Ligustrum vulgare - fagyal	