









6. Képmellékletek



1. kép: Erősen kiritkult, pusztuló akác telepítés a Kakukk-hegyen. A gyepszintben tömeges a védett homoki fátyolvirág (*Gypsophila arenaria*)



2. kép: Jó állapotú erdőssztyep folt a cross pályától K-re. Az előtérben tömeges a védett homoki kocsord (*Peucedanum arenarium*) és szórványos a kései szegfű (*Dianthus serotinus*)



3. kép: Jó állapotú homoki sztyeprét az épen maradt homokbuckákon a cross pályától D-Ny-ra.



4. kép: A cross motorosok által erősen degradált homok bucka.



5. kép: Kiszáradó kékperjés láprét maradványai a D-i területek telepített tölgyesében. A gyepszintben tömeges a kékperje (*Molinia caerulea*).



6. kép: Erősen degradált homoki gyepek az egykori birkalegelő területén. A területen tömeges a betyárkóró (*Coryza canadensis*).



7. kép: A fokozottan védett csikófark (*Ephedra distachya*) a cross motorosok által erősen bolygatott élőhelyen.



8. kép: A fokozottan védett homoki kikerics (*Colchicum arenarium*) telepített akácos alatt a Kakukk-hegy közelében.



9. kép: A védett konkoly (*Agrostemma githago*) a hazánkban is veszélyeztetett szántóföldi gyomnövény a cross pálya melletti kalászos vetésből.



10. kép: A területen kifejezetten ritka védett növényfaj a szártalan csüdfű (*Astragalus excapus*) a cross pályától D-Ny-ra eső jó állapotú sztyeprétben.



11. kép: A védett kései pitypang (*Taraxacum serotinum*) a szeméttelp melletti gyepben. Alföld szerte ritkaságnak számít



12. kép: A védett karéjos keresztespók (*Argiope lobata*) a cross pálya körüli homoki gyepben.