

# F E L H I V Á S

1.sz. melléklet a

.....<sup>9</sup>/2000.sz.(05.<sup>15</sup>....)  
rendeletehez.

## P A R L A G F Ū I R T Á S Á R A

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy mind egészségügyi, mind gazdasági szempontból jelentős problémát okoz a parlagfű nagymértékű elterjedése.

Az életminőséget nagybancsökkentő **asztma** súlyos formájában életveszélyes is lehet, melynek **okozója a parlagfű**. Gazdaságilag is jelentős terhet ró ránk a parlagfű : munka kiesés, táppénz, gyógyítási költség, gyógyszerköltség, egészségkárosodás, termés csökkenés, fertőzött vetőmag export meghiúsulás, idegenforgalom.

A **parlagfű** a következő jellemzőiről ismerhető fel : Porzós virágai a hajtások csucsán találhatóak, 15-35 apró lecsüngő, halványsárga színű. Julius 10-15-től október végéig virágzik. Levelei erősen szeldeltek, egy- és kétszeresen szárnyasan összetett levelei világoszöldek, puhák, spirálisan állók, bemetszett tojásdad cimpájuk, fonákukon rányomottan pelyhesek. Felső részében igen ágas szára rányomottan szőrös, vagy érdes, tompán négyélű. Magja a csiraképeségét 30-40 évig is megőrzi. Minden talajon és helyen egyaránt nő. Gabonaföldeken aratás után hirtelen növekszik, még más gyomnövényt is elnyom. Kapásokban kora nyártól kezdve folyamatosan nagymennyiségben jelenik meg.

**A Parlagfű irtása:** Leghatásosabb a megjelenésétől kezdve korai gyomirtással, tömegesebb előfordulása esetén a virágzás előtt végzett rendszeres kaszálással. A védekezést több éven keresztül következetesen el kell végezni.

Az irtásra legalkalmasabb időszak az, amikor a gyomnövény már jól felismerhető ( kikelés után 4-6 leveles állapotban ), de még nem virágzik. Ezért azt általában június-július hónapban feltétlenül kaszálni, géppel vágni, kézzel irtani, vagy vegyszerezni kell. Ezt követően szeptember végéig ha szükséges többször, de legalább még egyszer meg kell ismételni a beavatkozást.

Ennek megfelelően a települések belterületén a nem rendezett, gyomos területeket, a rétek, a legelők rendszeresen nem gondozott részit, a parlagföldeket, az utak mentén lévő területeket, az árokpartokat, az erdőségek gyomos részeit rendszeresen, évente legalább kétszer kaszálni kell.

Hazánkban más allergén növények közül ( mint nyír, mogyoró, éger, kőris, tölgy, pázsitfűvek, nyári, őszi gyomok, üröm ) mindenek előtt a **parlagfű** vált ki allergiás reakciót. Az allergiára való hajlam igazoltan öröklődik.

Az allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekek, felnőttek és a ma még egészségesek védelme érdekében **FELHÍVJUK A LAKOSSÁGOT A PARLAGFŪ IRTÁSÁRA !**

2000. 04. 18.

Vámos Istvánné sk.  
jegyző