

FELHÍVÁS A PARLAGFŰ ÁRTALMAIRÓL

Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE.

Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ (*Ambrosia elatior* L.), népies nevén vadkender. E növény pollenjeit a légáramlás a város egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.

A nyálkahártyatünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig, gyakran november közepéig – jelentkeznek a betegeknél.

Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.

Tünetek:

- erős orrfolyás,
- tüsszögés,
- orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
- könnyezés,
- rohamokban jelentkező nehézlégzés, mely tünetek igen kellemetlenek és a rendkívül rossz közérzeten kívül a munkavégzésben is zavarják a beteget.

A BETEG HOVÁ FORDULJON?

A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függően, hogy melyik tünet-együttes van előtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy tüdőgyógyászati kivizsgálás szükséges.

A legfontosabb feladat a betegség MEGELŐZÉSE.

A betegség megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével!

HOL TALÁLHATÓ EZ A NÖVÉNY?

Elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajokon, a beépítetlen, de elhanyagolt építési területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes területeken, a közművek és utak mentén, a zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területeken.

IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN?

A parlagfüvet – virágzás előtt – az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani.

A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trágyázás, öntözés, kaszálás) nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását.

A parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági területen) tekintetében a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakvéleménye az irányadó.

A parlagfű kötelező irtását a közigazgatási területén önkormányzati rendelet mondja ki.

Ezúton kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését.

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

Aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, akár több millió forint összegű bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra.

A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben kerültek szabályozásra.

A törvény általános kötelezettséggént írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) lehet elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A növényvédelmi bírság minimum 15 000 Ft összegű lehet.

Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy külterületen vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez.

Parlagfű külterületen

Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot, a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal).

A kormányhivatal elrendelheti a kényszerkaszálást és kiszabhatja a növényvédelmi bírságot is, és jogosult érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy külterületi ingatlannál a földhasználót nem kell értesíteni sem a helyszíni szemléről, és nem kell külön felszólítani parlagfű mentesítésére.

A földhasználó folyamatosan köteles gondoskodni ingatlana parlagfű mentesítéséről.

Parlagfű belterületen

Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a kényszerkaszálást is elrendelni, valamint a költségeket behajtani a földhasználótól. A növényvédelmi bírságot pedig szintén a kormányhivatal szabja ki.

Az ellenőrzésről nem kell értesíteni a földhasználót, de lezárt területre csak ügyésszel engedéllyel lehet behatolni.

Az eljárás lakossági bejelentésre is indulhat, ennek hiányában a hatósági ellenőrzés tervszerűen zajlik.

A törvényi felhatalmazás alapján a parlagfűmentesítés végrehajtásának és az állami, illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek és ennek igénylése

részletszabályait a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy minden földhasználó köteles június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot – gyomlálással, kaszálással vagy vegyszeres irtással – vegetációs időszak (szeptember-október) végéig folyamatosan fenn kell tartani!

A parlagfű irtását az Önkormányzat a város belterületén, azon kívül a jegyző illetve a kormányhivatal ellenőrzi. A hatósági eljárás során a helyszíni ellenőrzés alkalmával jegyzőkönyv készül. Amennyiben indokolt, úgy hatósági határozattal közérdekű védekezés kerül elrendelésre, mely azt jelenti, hogy a jegyző az Önkormányzat által megbízott vállalkozóval a terület parlagfűmentesítését elvégezteti. Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, költségére közérdekű védekezést rendel el és növényvédelmi bírságot szab ki az eljáró hatóság, aminek meg nem fizetése esetén az adók módjára behajthatók az azokat terhelő kamatokkal együtt.

Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.

IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET!

A kifejelett növény

A fészkesvirágzatúak családjába tartozó, 20-200 cm magas, orsógyökerű, felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó, terebélyes gyomnövény. Szára szőrös, tompán négyélű. Levelei egykétszeresen szárnyaltan szeldeltek, bemetszettek, fonákuk és a levélnyél pelyhesen szőrözött.

Ha a parlagfű szárát a talajfelszín magasságában elvágjuk, akkor elpusztul. A talajhoz közeli néhány cm-es szárrészen viszont 2-3 elágazása is van, ezért a kaszálás után általában újraahajt.



Porzós virágzat

A virágzat

A porzós és termős virágok külön fészkekben nyílnak. Az allergiát okozó nagymennyiségű pollen a hajtások csúcsán kifejlődő porzós virágzatokban képződik. A porzós virágok a termős virágok nyílását 7-10 nappal megelőzik. A parlagfű virágzása hazánkban többnyire július 10. után kezdődik. Tömeges virágzása augusztus és szeptember hónapban van. Sűrű állományban csaknem kizárólag porzós virágok képződnek, míg ritkább térállásban, tápanyagban gazdag talajon a termős virágok száma a nagyobb. A termős fészkek a felső lomblevelek hónaljában, a porzós virágzatok alatt találhatók, rendszerint egyvirágúak, ülők. A termős virágok beporzását a szél végzi.



Termős fészkek

A termés

A termés felső részén a pikkelylevelek 4-6, mintegy 1 mm hosszú tövisben végződnek. A termés érése október elején kezdődik. A magvak az érést követően nyugalmi állapotban vannak, évjáratától függően december végéig, január elejéig. Ezután kedvező körülmények között már képesek a csírázásra és csak az alacsony hőmérséklet korlátozza a csírázást.



A csíranövény

Az eredményes védekezéshez alapvető fontosságú, hogy a csíranövényeket felismerjük. A parlagfűvet eredményesen irtó gyomirtó szerek többségének hatékonysága a parlagfű 6 leveles állapotától erősen csökken.


A csíranövény sziklevei szélesek, elliptikusak, csúcsuk lekerekített, levélnyélre keskenyedők, 3-4 mm szélesek. A sziklevek szélén lilás foltok találhatók.



Szikleves parlagfű növények



Kétleves parlagfű



Négyleves parlagfű



Hatleves parlagfű

Az első lomblevelek keresztben átellenesek, lándzsásak vagy tojásdadok, hegyes csúcsúak, szárnyasan tagoltak, a későbbi lomblevelek pedig szórt állásúak, rövid nyelűek, tojásdad alakúak. A legfelső szárlevelek esetenként tagolatlanok. A levelek színe sötétzöld, vastagon, tompán szőrözött, fonákuk sötétszürke, sűrűn szőrözött.

Intenzív növekedés, virágbimbó megjelenése

A parlagfű fő csírázási időszaka április és május hónapban van. Május végétől intenzív növekedési szakasz kezdődik.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. A törvényi előírás miatt fontos a virágbimbós növény felismerése. Akadályozzuk meg, hogy eddig a fejlettségig eljusson a parlagfű!



Intenzív vegetatív növekedésben lévő növények



Virágbimbó megjelenése fejlettségű parlagfű

Összetéveszthető növények

A parlagfűvet a gyomnövények közül leggyakrabban a fekete ürömmel tévesztik össze, amely ugyancsak allergén hatású és fészkesvirágzatú növény. A parlagfű hivatalos elnevezése, az ürömlevelű parlagfű név is mutatja, hogy hasonlóak a levelei a fekete ürömhöz. A fekete üröm évelő növény, levelei alul fehér molyhosak, felül sötétzöldek, a parlagfű leveleinél sötétebb színűek. A két növény elkülönítését segíti, ha megnézzük az alsó leveleket. A fekete üröm legalsó levelei csak karéjosak vagy hasogatottak, míg a parlagfű levelei szeldeltek. A felső levelek alapján már nehezebb az elkülönítés, mert azok a fekete ürömnél is többnyire szeldeltek.



fekete üröm



parlagfű

A fiatal növények könnyen megkülönböztethetőek. A fekete üröm első levelei alig tagoltak, szélük fűrészfogas.



fekete üröm



parlagfű

A parlagfűhöz hasonló levélformájú még a dísznövények közül az ugyancsak fészkes virágzatú bűdöske. A bűdöske jóval alacsonyabbra növő növény, mint a parlagfű, levelei páratlanul szárnyaltak.



bűdöske



parlagfű

A kényszerkaszálás díja: 50 -Ft/m² + ÁFA

A kiszállás díja: 3.000-Ft/alkalom + ÁFA